

COLICALIVherbarium

Matricaria chamomilla 4CH, Mentha piperita 6CH, Magnesia phosphorica 5CH, Colocynthis 6CH

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

APRESENTAÇÃO
Solução oral (gotas) – frasco gotejador de plástico opaco com 30 mL.

USO ORAL
USO PEDIÁTRICO A PARTIR DE 0 MESES


COMPOSIÇÃO
Cada 1 mL (16 gotas – 62,5 mg/gota) contém:
Matricaria chamomilla 4CH 0,25 g
Mentha piperita 6CH..... 0,25 g
Magnesia phosphorica 5CH..... 0,25 g
Colocynthis 6CH..... 0,25 g
excipientes água purificada, benzoato de sódio, citrato de potássio e ácido cítrico.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:
PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Colicaliv é um auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em recém-nascidos e crianças.
A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Modo de usar
Pingar as gotas de Colicaliv em uma colher antes de administrar o medicamento ao bebê. **Não é recomendado administrar o medicamento diretamente na boca da criança.**

Posologia
Administrar 5 gotas, via oral, de 3 a 6x ao dia antes de cada mamada, ou conforme orientação médica. Geralmente, os bebês apresentam alívio nas primeiras doses, porém, alguns podem levar mais tempo para demonstrar melhora. Por isso, recomendamos administrar Colicaliv por até 7 dias para observação de uma melhora nos sintomas. A partir da percepção de melhora, a dosagem pode ser diminuída progressivamente ou conforme orientação médica. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional da saúde. A duração esperada do tratamento é de 30 dias.

Instruções de uso do frasco com batoque gotejador:



1. Segure o frasco de Colicaliv verticalmente, conforme a ilustração ao lado, pingando as gotas em uma colher antes de administrar. Não é recomendado administrar o medicamento diretamente na boca da criança.

2. A primeira gota pode demorar um pouco para sair, mas na posição vertical as gotas sairão normalmente, sem necessidade de agitação do frasco.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada (via oral). O uso por outras vias pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

Os componentes ativos de Colicaliv favorecem o alívio das cólicas infantis, que, de acordo com os princípios da homeopatia, estimulam suavemente a capacidade de cura do organismo.

A cólica infantil é caracterizada por choro excessivo, sem causa aparente, acompanhado de espasmos agudos, com duração de 3 horas por dia, ocorrendo ao menos 3 dias na semana. Geralmente, os bebês apresentam cólicas entre seis semanas de vida e seis meses de idade. Apesar de não definida, sugere-se que o desenvolvimento incompleto do sistema digestório do bebê possa ser a causa das cólicas.^{1,2}

REFERÊNCIAS
1 ZEEVENHOOVEN et al. Infant colic: mechanisms and management. Nature Reviews - Gastroenterology & Hepatology. 2018.
2 JOHNSON, J. D.; COCKER, K.; CHANG, E. Infantile Colic: Recognition and Treatment. American Family Physician. 2015.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Ainda não foram registradas interações no uso deste medicamento associado a alimentos ou outros medicamentos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações. Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 30 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia sem a necessidade de suplementação.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.
Caso você esqueça de utilizar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
Não são conhecidos relatos de reações adversas com uso deste medicamento. Colicaliv é uma combinação de ativos homeopáticos, cada um com longo histórico de uso seguro.
Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico do aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
NÃO CONTÉM ÁLCOOL, LACTOSE, AÇÚCARES E CORANTES.
Não há ingredientes sedativos ou desenvolvedores de dependência na fórmula de Colicaliv.
Este produto contém benzoato de sódio, que pode causar reações alérgicas, como a asma, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Cuidados de conservação
Armazenar em temperatura ambiente (de 15 a 30 °C).
Prazo de validade
24 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.
Após aberto, válido por 12 meses.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
Características físicas
Forma líquida, límpida e incolor.
Características organolépticas
Praticamente não apresenta cheiro e sabor.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.
O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?
Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 721, de 1º de julho de 2022.

Farmacêutica resp.:
Gislaine B. Gutierrez
CRF-PR nº 12423

Notificado e comercializado por:
HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.
Av. Santos Dumont, 1100
CEP 83403-500 • Colombo - PR
CNPJ 78.950.011/0001-20
Indústria Brasileira
Produzido por:
VIDORA FARMACÊUTICA LTDA.
Rua Alberto Rangel, 823
Porto Alegre - RS • CNPJ 92.762.277/0001-70


CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 723 8383
www.herbarium.com.br



02310154 Rev 02 F11 AR03 - PHC81

CÓDIGO	VERSÃO	DESCRIÇÃO	REVISÃO TEXTO
02310154/02		COLICALIV	AR03
SUBSTITUI	MOTIVO:	CIRCULAÇÃO	
02310154/02	HLB-CM-0333 – ALTERAÇÃO DE ROTULAGEM DE TODOS OS MEDICAMENTOS DA EMPRESA	20/03/25	
REFERÊNCIA DE COR	PHARMACODE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
 Pantone Black	81	NA	
	EAN	140x250 mm	
	Padrão de cor	1:1	
PC02			
Reservado para carimbo de aprovação	Reservado para carimbo de aprovação	Reservado para carimbo de aprovação	
APROVADOR DESEMB	APROVADOR DEARE	APROVADOR GEMAK	